

Le Furet



Mais qui est-il?

Présentation

Le furet est un petit carnivore de la famille des mustélidés (*Mustela putorius furo*). Il n'existe pas à l'état sauvage, si vous pensiez l'avoir aperçu, il s'agissait plus probablement d'un proche cousin tel que la fouine, le putois, l'hermine...



Il est officiellement considéré comme carnivore domestique depuis 1994, au même titre que le chien et le chat. Sa domestication date de 2000 ans, d'abord pour ses aptitudes à chasser les nuisibles et plus précisément pour la chasse aux lapins, il fut également exploité pour la production de fourrure et comme animal de laboratoire.

C'est aux Etats-Unis qu'il devient animal de compagnie il y a une quarantaine d'années car sa petite taille et sa discrétion permettent de le maintenir en intérieur sans attirer l'attention dans les villes où chiens et chats sont interdits dans la plupart des logements. En France, il entre dans nos foyers au début des années 80, avec 1 million d'individus, il est actuellement le 3^{ème} animal de compagnie préféré des français.



Il n'existe pas de races de furet, cependant on distingue des types morphologiques : le type longiligne et le type compact dans lequel se place le furet angora caractérisé par une fourrure à poils plus longs et un nez bifide. Cet animal issu d'une mutation génétique a été spécialement sélectionné par les producteurs de fourrure.

La fourrure du furet peut-être colorée, il est alors dit putoisé, ou totalement dépourvue de pigmentation chez l'albinos.



Parmi les putoisés les robes sont distinguées entre elles selon divers critères :

-la couleur des poils, du sous poils, des yeux et

du nez,

-la répartition des poils colorés sur le corps selon un patron,


-la présence ou non de taches blanches et leur répartition sur le corps.



Pourquoi le choisir ?

La **personnalité** d'un furet est assez attirante car il est vif, curieux, espiègle, joueur, toujours en action lorsqu'il est éveillé, il est très intéressant à observer. Ce qui ne l'empêchera pas de venir chercher **caresses et câlins** et d'éventuellement s'endormir sur son maître.

D'un autre côté, il est aussi **gros dormeur** (18 à 20 heures par jour selon l'âge et la saison), il s'adapte facilement aux horaires de son maître. Il n'a **pas besoin de sortir à l'extérieur**, quelques heures de liberté dans l'appartement lui conviennent. Son petit gabarit (600 g à 1,200 kg pour une femelle, 1 à 2 kg pour un mâle) permet de le déplacer facilement. C'est également un animal silencieux qui ne dérangera pas les voisins et rajoutons qu'il cohabite facilement avec chien ou chat avec un peu d'entraînement (éviter les rongeurs et les oiseaux dont il peut faire son dîner).



Le budget

Une fois passés les frais d'équipement et de vaccination, **le budget mensuel moyen est assez faible** (compter 15 à 30 € pour la nourriture, la litière et autres fournitures). Il est également moins cher à l'achat qu'un chien ou un chat (30-50 € brut chez un chasseur ou 80-300 € chez un éleveur amateur ou professionnel). Cependant prévoyez une enveloppe santé car en cas de nécessité la note du vétérinaire peut grimper très vite.

Pourquoi ne pas tenter l'expérience?

Les points négatifs de ce petit voleur sont à considérer avec attention avant de l'acquérir.

Sa petite taille le prédispose aux accidents domestiques et son besoin d'explorer exacerbé lui joue parfois des tours, il se retrouve souvent dans **des situations dangereuses**. Il peut chuter dans le vide, se perdre dans les canalisations, s'électrocuter en grattant les fils d'un appareil électroménager, etc. Il faudra donc le surveiller de très près lors de ses sorties et sécuriser son aire de jeu et d'exploration.

S'il ne fait pas de dégâts, il est expert pour certaines **bêtises** comme creuser le matelas en mousse du canapé ou déterrer les pots de fleurs, etc.




Si votre logement est ouvert sur l'extérieur, il faudra vous organiser car il ne sait pas revenir et s'égare facilement.



Son odeur est particulière et il faut en connaître les sources. La peau du furet contient des glandes sébacées qui sécrètent un sébum gras et odorant, la **stérilisation** diminue très fortement sa production et donc l'odeur corporelle de l'animal. Comme tous les mustélidés, il possède également **deux glandes anales** très développées dont il libère le contenu en cas d'émotion, l'odeur alors dégagée est pestilentielle mais éphémère.

Enfin, il faut attacher beaucoup d'importance à l'hygiène de la cage et plus particulièrement à la caisse, **les excréments** sentent forts, le mieux est de les évacuer tous les jours.



Lequel choisir et où ?

A ce jour, les furets présents sur le marché français sont essentiellement issus de deux origines possibles et cela conditionne leur caractère et leur potentielle santé.

La première source est le clapier d'un **chasseur**. On y trouve des animaux plutôt rustiques, de type longiligne, vifs et agiles. La recherche de l'aptitude à la chasse va de pair avec un caractère peu docile et une tendance à mordre facilement.

L'avantage est une santé plus robuste, surtout si le chasseur prend garde d'éviter la consanguinité dans son cheptel et de nourrir correctement.

La seconde source est la **ferme d'élevage** dans laquelle ont été sélectionnés des animaux destinés aux laboratoires d'expérimentation animale ou à la production de fourrure, c'est là que se fournissent la plupart des animaleries. Par conséquent une morphologie plus compacte, un caractère plus calme et docile sont généralement conservés. Ces caractéristiques assez adaptées à la compagnie ont contribué au succès du furet aux États-Unis.



Malheureusement l'élevage intensif et l'absence de sélection sur la longévité ont conduit à des lignées fragiles. L'espérance de vie d'un furet issu de ce type d'élevage est faible (3 à 5 ans contre 8 à 10 ans pour un furet plus rustique issu de lignées de chasse) et les pathologies lourdes peuvent se multiplier sur un même individu.

Un travail de sélection d'animaux destinés à la compagnie et réunissant les qualités nécessaires à cet usage (docilité, santé...) reste à faire. Il commence à prendre forme chez les amateurs éclairés. Pour cette raison avant d'acquérir un furet, où que ce soit (animalerie, élevage, particulier), il faudra vous renseigner sur les origines des reproducteurs et les conditions d'élevage.




A éviter

Les animaux stérilisés de manière précoce : avant l'âge de 6 mois chez la femelle et 10 mois chez le mâle.

Les animaux trop âgés en animalerie ou en élevage : l'absence de manipulations et d'éducation dans les premiers mois a des conséquences importantes sur la sociabilité de l'animal. On obtient un animal peureux et mordeur.

Les couleurs : certaines couleurs de pelage sont associées à des problèmes de santé. La présence de **taches blanches** en particulier sur la tête peut être associée à une surdité et les individus porteurs de taches blanches peuvent être génétiquement prédisposés aux cancers.

La couleur «black» (noire) est souvent obtenue par un croisement proche avec un putois conduisant à des hybrides moins dociles et plus méfiants, peu sociaux avec leurs congénères donc moins adaptés à la compagnie.



Les furets angoras : ils ont malheureusement été sélectionnés à la base dans des fermes d'élevage pour la production de fourrure au détriment de leur santé à long terme.

ATTENTION : une furette angora ne produit pas de lait, la reproduction de ce type de furet doit être réservée aux éleveurs expérimentés.



Les animaux non identifiés : certains éleveurs pourront vous proposer moins chers des animaux non pucés.

REFUSEZ. L'identification est le seul moyen que vous avez d'obtenir un recours en cas de problème.

En conclusion, on peut trouver son furet

- Chez un chasseur (30-80 € brut),
- Dans une animalerie (250-450 € identifié, vacciné, et malheureusement souvent déjà stérilisé),
- - Chez un éleveur professionnel ou amateur (150-300 € identifié, vacciné).
- En association (160€ identifié, vacciné, stérilisé, déparasité, et avec un caractère connu).

Mâle ou Femelle ?

Comme dans toutes les espèces il existe des différences entre mâle et femelle. Chez le furet la taille varie énormément entre les deux sexes. La femelle est plus petite que le mâle, par conséquent elle est plus agile et vive, elle peut se montrer particulièrement coquine et apte aux bêtises. Le mâle sera plus gros et pataud, mais il peut aussi faire montre de plus d'agressivité dans certains cas.

Leur comportement sexuel est très différent.

Le mâle en rut dégage une odeur corporelle très forte et effectue un marquage actif de son milieu en déposant des traînées d'urine sur tous les supports qu'il rencontre. Il peut également montrer plus d'agressivité envers son entourage et présente un comportement harcelant vis-à-vis de ses congénères qu'ils soient stérilisés ou non. Si vous désirez le garder entier, il faudra l'isoler pendant les 8 mois de l'année où s'exprime le rut (de décembre à août) et supporter son odeur (de bouc) et son comportement de marquage exacerbé. Une fois stérilisé, il redeviendra le jeune furet joueur et affectueux que vous avez acheté mais il faudra patienter jusqu'à ses 10-12 mois avant d'envisager la stérilisation.

La femelle a une activité sexuelle moins expressive.



Stérilisation

La stérilisation consiste à rendre un animal inapte à la reproduction. Pour cela on peut empêcher la production d'hormones sexuelles.

Elle peut être :

* chirurgicale, elle est alors définitive avec l'ablation des glandes sexuelles.

* chimique, par l'intermédiaire d'un implant inséré sous la peau. Le cerveau reçoit un message lui signifiant que ce n'est pas la saison de reproduction, cet effet est temporaire.

Les mâles rentrent en rut au mois de décembre mais ne sont fertiles que deux mois après le début des premiers signes.

Quels sont les signes du rut ?

Un mâle entier change de comportement, il peut se mettre à mordre de « désir » (des morsures qui font plus ou moins mal selon son autocontrôle).



Il faut généralement séparer le furet de ses congénères car ce dernier ne pensera qu'à les tirer par la peau du cou utilisant si besoin la force. Il marque son territoire avec des traînées de pipi et sent fort, il réalise aussi un marquage fécal en déposant des selles à des endroits bien visibles. Le sébum de sa peau est très gras et il sécrète une fine odeur de bouc !

Il a un comportement d'exploration et de recherche de partenaire permanent conduisant souvent à une perte de poids.

Quels sont les signes de chaleurs ?

Un gonflement important de la vulve

Elles démarrent généralement au printemps mais elles sont parfois décalées en fonction des changements climatiques. Elles persistent en moyenne 120 jours s'il n'y a pas de coït.


Pour les furettes qui ne sont pas destinées à la reproduction, il est impératif de les stériliser.

Si l'accouplement n'a pas lieu la production d'œstrogènes (hormones sexuelles femelles) est alors permanente et persistante.



Ces hormones à haute dose et en action continue, sont toxiques pour les cellules de la moelle osseuse (les cellules qui produisent les globules rouges et une partie des globules blancs), la furette risque alors l'aplasie médullaire (destruction de la moelle osseuse).

La furette devient apathique (fatiguée), anorexique (arrête de s'alimenter), elle perd du poids et des poils puis apparaissent des infections utérines qui vont jusqu'à entraîner leur mort.



Quelle méthode de stérilisation choisir ?

Depuis la commercialisation de l'implant il y a 5 ans, beaucoup le préfère à la stérilisation chirurgicale cependant certains problèmes sont maintenant connus et il faut bien réfléchir avant de conclure à l'intérêt réel de cette technique.

La stérilisation chirurgicale consiste à stopper la production d'hormones définitivement.

Chez la femelle il faut pratiquer une ovario-hystérectomie c'est-à-dire l'ablation des ovaires, de l'utérus et des cornes utérines afin d'éviter une potentielle repousse d'ovaires.

Il faut attendre l'âge de 6 mois pour effectuer la stérilisation de la furette.

Pour les mâles, l'opération consiste à retirer les testicules, et il faut attendre leur 10-12 mois.

Plus l'animal est jeune mieux il s'en remettra (ne pas stériliser avant les âges conseillés ni trop âgés).

Les points sont résorbables ou non selon votre vétérinaire.

Il est préférable de ne pas mettre de pansement.



Le furet est sujet aux crises d'hypoglycémie car son transit est rapide (3/4h) et sa consommation de glucose élevé. Il ne faut donc pas les laisser à jeun plus de 3h avant l'opération et veiller à ce que le furet remange rapidement après l'intervention.

Il est préférable de choisir un vétérinaire qui est équipé pour opérer les furets et qui utilise une anesthésie gazeuse. Le gaz anesthésiant permet un meilleur contrôle du sommeil et un réveil plus rapide.

On parle beaucoup de la maladie des glandes surrénales, elle apparaît 3 à 4 ans après la stérilisation chez certains furets (avec une prévalence de 0.5% chez les furets européens).

Cette maladie est liée à une hypertrophie d'une ou des 2 glandes surrénales qui produisent alors des hormones stéroïdes en excès.

Les symptômes peuvent être discrets et saisonniers au départ. Le furet est en alopecie, il montre des signes de cycle sexuel : les furettes ont la vulve qui gonfle, les mâles ont un comportement de rut. Puis des signes s'accroissent et se généralisent : amaigrissement, alopecie généralisée, fatigue, signes liés à l'aplasie médullaire déjà cités chez la furet, gonflement de la prostate et difficultés à uriner chez le mâle...

Seule l'échographie permet un diagnostic fiable de cette affection grâce à l'examen et à la mesure des glandes surrénales. La pose de l'implant de desléroline est alors pratiquée pour éviter l'opération de la glande affectée.

Cette pathologie touche 1 furet sur 200 en Europe (25% des furets aux USA), plusieurs facteurs favorisants sont à considérer : une stérilisation PRECOCE, une exposition à la lumière trop longue (photopériode) et enfin un facteur génétique (qui explique la grande différence entre les furets européens et américains).



L'implant de desléroutine consiste à une libération continue d'un analogue de la GnRH qui entraîne une inhibition de l'axe hypophysogonadique, ce qui signifie une inhibition des hormones responsables de la fertilité donc de la reproduction.

Il est légèrement plus grand qu'un grain de riz et s'insère comme une puce électronique en sous cutanée, sous anesthésie gazeuse pour éviter de blesser l'animal.

L'implant libère son principe actif quotidiennement et agit pendant 1 an environ.



Deux types d'implant existent sur le marché (un dosage à 4.7 mg de desloréline et un autre à 9.4 mg qui dure plus longtemps), ils ont été conçus pour contrôler la fertilité du chien mâle.

Il n'y a pas d'étude sur le sujet, seulement des enquêtes de terrain. On ne constate pas d'effets secondaires flagrants sur la première implantation. Cependant de nombreuses furettes se montrent très agressives dans les jours qui suivent la pose d'un implant avec un comportement de protection du « nid » exacerbé. Ce comportement perdure (contrairement à la même réaction qui suit une stérilisation chirurgicale d'une furette en chaleurs qui passe spontanément en 2 ou 3 semaines). Le moment de l'implantation par rapport au démarrage du cycle œstral est peut-être en cause mais aucune étude n'a été menée pour expliquer ce phénomène. Les mâles se montrent souvent extrêmement territoriaux suite à l'implantation.

C'est après la pose du 2^{ème} et 3^{ème} implant qu'on constate des cas de cancers des testicules chez le mâle, des infections de l'utérus à des stades variés chez la femelle (métrites, pyomètres) ; chez certaines la reprise d'un cycle discret peut conduire à des débuts d'aplasie

médullaire, quelques cas même d'hypertrophie des glandes surrénales ont également été signalés.



De plus en plus de propriétaires sont obligés de stériliser de manière chirurgicale leur furet implanté car souvent des effets apparaissent après la pose du deuxième implant et pour certains dès le premier.

Pour toutes ces raisons nous ne pouvons pas affirmer pour l'instant que la méthode de stérilisation par implant est meilleure pour la santé du furet que celle par chirurgie. Une étude sérieuse fait défaut avec des chiffres à l'appui permettant de conclure sur plusieurs points (notamment le moment le plus judicieux pour implanter).

Si votre vétérinaire sait opérer les furets, il est préférable de choisir la stérilisation chirurgicale.

Jeune ou adulte ?

Si vous optez pour un fureton, l'âge idéal d'adoption est de :
8 semaines.

C'est le temps nécessaire et indispensable pour un bon développement et une bonne socialisation auprès de la mère et de la fratrie.

Si vous êtes novice et que vous découvrez cet animal le choix d'**un adulte** peut-être assez judicieux.

Un animal déjà éduqué remis en confiance dans une famille d'accueil expérimentée vous permettra de découvrir le furet avec beaucoup moins de difficultés qu'avec un jeune turbulent.

De plus, une association saura vous conseiller l'animal adulte dont le caractère est connu et qui correspond le mieux à votre foyer.



Comment l'installer chez soi ?

Le comportement du furet s'articule sur 3 points principaux : **le sommeil, le jeu et l'exploration**. Pour qu'il soit heureux il va falloir aménager son milieu afin qu'il puisse exprimer au mieux ses comportements. De plus comme le chat, le furet est parfaitement **territorial** et cela inclut certains comportements qu'il faut prendre en compte lorsqu'on cohabite avec lui.

Cage ou liberté ?

Le furet est un **grand explorateur**, il veut tout voir, tout inspecter et pour cela il est prêt à faire beaucoup

d'efforts. Il va soulever des objets, les déplacer avec son nez, gratter avec ses pattes, ouvrir les portes des

placards, grimper le long des rideaux ou des radiateurs. Il va entrer dans tous les espaces qui s'offrent à lui, le tambour de la machine à laver, les canalisations, les bouches d'aération, etc.

Il renverse tout sur son passage, vide le contenu d'un placard et ne résiste pas à la terre d'une plante ou d'une jardinière. Ce comportement va mettre à mal votre décoration et va surtout être dangereux pour un animal de si petite taille. Il peut être blessé par un objet lourd, s'électrocuter en grattant les fils électriques d'un appareil électroménager, se noyer dans la cuvette des WC ou encore basculer dans le vide en grimpant sur le bord de la fenêtre. Si vous choisissez de le laisser **en liberté** dans votre appartement, il va falloir envisager quelques aménagements.



Pour cela il faut faire preuve d'autant d'imagination que lui et sécuriser l'accès à certains endroits, condamner les passages derrière les équipements électroménagers surtout, mettre en place quelques planches suffisamment hautes pour qu'il ne puisse pas les franchir (au moins 70 cm pour un mâle) et parfaitement lisses pour qu'il ne puisse pas s'y agripper.



Il faut aussi acquérir certains réflexes comme baisser l'abattant de la cuvette des toilettes, ne jamais laisser de chaise sous la fenêtre ouverte, etc.

Pour sa propre sécurité (et pour votre tranquillité) il est préférable de prévoir **une cage** ou **un parc adapté** où il sera bien installé en particulier lorsque vous êtes absent.

Cet espace constituera sa tanière où il sera parfaitement en sécurité et où il se retirera volontiers de lui-même. C'est également une bonne option lorsque vous recevez des visites, déjà car une personne non expérimentée n'aura pas les bons réflexes en présence d'un furet et d'autre part car un furet peut avoir un comportement particulièrement harcelant lors de l'arrivée d'un intrus dans son territoire.


La Cage

Les dimensions idéales sont 100x50x50 cm pour un ou deux furets. Elle doit être organisée de façon à respecter 3 espaces indispensables : le nid (fermé et douillet), la litière (à l'opposé du nid), les gamelles (de nourriture et d'eau). La présence d'un étage convient parfaitement. Une aire de jeu est bienvenue.

Les accessoires

Quelque soit le choix des équipements, ils doivent être lourds ou fixés à l'intérieur de la cage car le furet renverse et déplace tout.

Le nid ou dodo doit être douillet, fermé et pourvu d'un linge dans lequel le furet peut s'enfouir. Il apprécie également une sieste dans un **hamac** suspendu, un tunnel ou tout autre refuge douillet et fermé.



La litière doit être suffisamment large et adaptée à sa manière de faire ses besoins. En effet, le furet élimine d'une manière très particulière : il choisit un coin de son espace, se retourne et recule en s'accroupissant pour viser le coin et émettre en même temps les selles et les urines.

Si vous choisissez de mettre un bac à litière, il doit être assez grand pour que le furet rentre dedans avant de se retourner et de reculer (car il ne peut pas grimper un rebord en même temps qu'il recule), pour cette raison les bacs d'angle proposés dans le commerce ne conviennent pas au furet. La litière elle-même est la même que pour les chats (minérale, agglomérante, éviter les copeaux de bois et toute litière trop poussiéreuse), certains optent pour un simple journal ou du pellet de bois.

Les gamelles doivent être lourdes ou fixées à la cage sous peine d'être renversées.

Elles doivent être en matière parfaitement inoxydable. Le biberon ou pipette est apprécié et pratique, et permet d'assurer une bonne source d'abreuvement parfaitement propre.



Les furets adorent disposer d'une gamelle d'eau dans laquelle ils barbotent volontiers en grattant la surface de l'eau avec leurs pattes avant. Cependant cette activité est parfois si énergique que la moitié de l'eau se retrouve hors de la gamelle. Pour éviter les inondations, il est préférable d'installer la gamelle en de-

hors de la cage et de prendre soin de la poser sur un plateau.

L'eau et la nourriture doivent être renouvelées tous les jours, les gamelles et les biberons parfaitement lavés à cette occasion.




La cage représente l'espace privilégié de votre furet et il apprécie cette petite tanière, cependant il est aussi un grand explorateur et il a besoin d'une ou de plusieurs sorties quotidiennes (2 à 4 heures par jour minimum). Pendant ses escapades il appréciera la présence de jouets, balle, peluche, tunnel, jouet suspendu, simple carton rempli de bouchons, sac en papier... Une partie de jeu avec son maître ou le chien et chat le ravira également. Il apprécie particulièrement les contacts.

Le furet est particulièrement joueur même lorsqu'il est adulte, les jouets doivent être à disposition.

ATTENTION certaines matières sont à proscrire.

Comme beaucoup de carnivores le jeune furet découvre son

environnement en mordillant les objets qu'il croise, chez le furet ce comportement juvénile perdure à l'âge adulte et plus particulièrement vis à vis de certaines matières tels que le caoutchouc, l'éponge, certains plastiques, le savon, etc. Ce comportement peut entraîner des troubles digestifs plus ou moins graves (gastrite, ulcères, occlusion par corps étranger).



L'emplacement et la température idéale

La cage doit être installée dans un endroit sec et aéré mais hors courant d'air. Les températures optimales vont de 15 à 21°C. Il supporte très mal la chaleur, il est gêné au-dessus de 27°. En été lors des fortes chaleurs maintenez-le dans un endroit sombre et frais, mettez à disposition une bassine d'eau et des linges humides, brumisez le régulièrement, placez une bouteille d'eau glacée dans son dodo, etc.

L'éclairage

Le furet doit suivre un rythme de 12 heures d'éclairage pour 12 heures d'obscurité. Lorsqu'il vit en intérieur, il faut prendre garde de **ne pas allonger le temps d'éclairage** avec l'éclairage artificiel car cela favorise le déclenchement de la maladie des glandes surrénales.



Les soins

Le furet réclame peu de soins. Il faut simplement inspecter ses oreilles et lui couper les griffes tous les 15 jours environ.


Les oreilles

Le furet sécrète un **cérumen épais et marron** qu'il faut éliminer par un nettoyage régulier. Pour cela vous pouvez utiliser n'importe quel nettoyant auriculaire pour chien ou chat. Il est fréquent que des **gales** (petits acariens parasites) soient installées dans les pavillons auriculaires. Il faudra alors prévoir un traitement antiparasitaire que votre vétérinaire vous fournira après avoir vérifié au microscope la présence du parasite.



Les griffes

Elles sont longues et pointues mais non rétractables comme chez le chat. Elles doivent être coupées régulièrement sinon elles s'accrochent aux tissus surtout lorsque le furet a tendance à gratter son nid, en se dégageant, il peut se blesser.



Le pelage

Il n'est pas utile de brosser son furet sauf pendant les périodes de **mues** qui ont lieu au printemps et à l'automne. La chute de la fourrure est alors rapide (sur quelques jours) et la totalité du pelage est renouvelé. Il faut tirer sur les poils morts afin de faciliter leur chute ou brosser. Cela évite qu'ils soient avalés par le furet. Il existe une alopecie saisonnière de la queue (la queue est dépourvue de poils). Elle se produit l'été et est liée à l'allongement de l'éclairage quotidien. Les poils réapparaissent à l'automne.



Le bain

Il n'est pas utile de baigner son furet. Au contraire plus vous le lavez, plus vous sollicitez la production de sébum par la peau donc plus vous activez son odeur corporelle. Vous pouvez effectuer un shampoing uniquement lorsqu'il est sale (maximum 1 fois par mois) et vous pouvez le mouiller à l'eau claire l'été lorsqu'il fait chaud.

Les soins vétérinaires

Vaccination

Il est impératif de faire vacciner votre furet contre la **maladie de Carré**, même s'il ne sort pas, car il s'agit qu'un virus mortel à 100% pour cette espèce et c'est le seul moyen de le protéger. Cette vaccination doit être effectuée grâce à 2 injections à un mois d'intervalle la première année (quelque soit l'âge du furet) puis une fois par an.

La vaccination contre la **rage** n'est obligatoire que pour voyager à l'étranger comme pour le chien et le chat.

Parasites

Il faut également prévoir de **vermifuger** tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois puis au moins 2 fois par an. Le furet est porteur de parasites intestinaux et plus particulièrement de protozoaires.

Comme le chien et le chat, le furet attire **les puces et les tiques**, en particulier s'il sort. Vous pouvez utiliser les mêmes antiparasitaires externes que pour le chien et le chat, il faut juste adapter la dose.



Les maladies à connaître :

Le furet est sensible à de nombreux virus.

Il est le seul animal de compagnie qui peut attraper la **grippe**. Il faut donc prendre garde de ne pas le manipuler lorsqu'on est grippé.

Le virus le plus mortel pour lui est celui de la **maladie de carré**. Pour cette raison il faut impérativement le vacciner même s'il ne sort pas de chez vous car vous pouvez être le véhicule du virus.

Le point faible du furet est son système **digestif**. Il souffre volontiers de **diarrhées** qu'il ne faut surtout pas négliger car elles ont vite des conséquences importantes et peuvent laisser des séquelles.



De plus l'attirance excessive du furet pour certaines matières (mousse, caoutchouc...) le prédispose à l'**occlusion** intestinale. Il faut être vigilant et consulter rapidement un vétérinaire en cas de problème.

Certains cancers sont malheureusement fréquents, c'est le cas de l'insulinome , du lymphome et de la maladie des glandes surrénales .

Besoin alimentaires du furet :

Protéines en %	34 à 40
Matières grasses en %	18 à 28
Acide linoléique en %	1.4
Glucides en %	22 à 35
Fibres en %	2 à 3
Minéraux en %	8 à 10
Energie en kcal/g	4 à 5

L'alimentation

Le furet est un **carnivore** strict dont le tube digestif est court et doté de systèmes de digestion très simples. Il en résulte un transit digestif très rapide, environ 3 heures, qui laisse peu de temps pour la digestion et l'absorption des nutriments. Il faut donc lui fournir un aliment très digestible, riche en protéines et en graisses, mais pauvre en fibres et en sucres. Il fait une dizaine de repas par jour et il aime cacher sa nourriture.

Les croquettes de haut de gamme pour furet ou pour chaton répondent parfaitement aux besoins du furet. Il faut lui laisser à disposition, il régule parfaitement sa prise d'aliment sur 24 heures.

D'autre part le furet devient vite exclusif pour le goût de ses aliments, il est préférable de choisir deux bonnes croquettes de base plutôt d'une.

Il faut éviter de lui donner d'autres aliments, tels que les fruits, les légumes, les friandises, même s'il a tendance à réclamer car il n'est pas adapté pour les digérer.

Ceux-ci vont nuire à la consommation d'un repas équilibré et provoquer des troubles digestifs.

Le chocolat et les aliments trop salés (charcuterie, biscuits salés) sont toxiques.

Les aliments humides en conserves ne sont pas assez concentrés pour répondre aux besoins énergétiques élevés du furet et ils favorisent le dépôt de tartre sur les dents.

Comment reconnaître une croquette de qualité ?

C'est avant tout une croquette qui contient **de la viande**. En effet le taux de protéines indiqué sur l'emballage est un taux global qui compte toutes les protéines contenues dans le sac qu'elles soient d'origines animales ou végétales, hors le furet est hautement carnivore et il lui faut un minimum de protéines animales.

Une croquette de moyenne gamme contient 30-35% de viande, une croquette haut de gamme avoisine les 75 à 90 % de viande.

D'autre part, il faut examiner la composition et s'assurer que les deux premiers ingrédients au moins sont des produits carnés.



Les compléments et friandises.

Ils ne sont pas nécessaires (sauf pour les animaux en reproduction, en convalescence ou âgés).



Utilisez de la bouillie de croquettes et du fortol (cf fiche bouillie)

Si vous désirez lui faire plaisir, vous pouvez lui donner un comprimé de levure de bière (riche en vitamines B, en biotine et en oligo-éléments), il en est souvent très friand ou du nutriplus gel (gel nutritif pur carnivore) très utile pour immobiliser son furet en cas de soins ou d'examen ainsi que pour la prise de médicament.

Le fortol est un aliment complet alors que le nutriplus gel est un complément alimentaire.



Le furet et les autres animaux :



Les furets vivent volontiers en groupe, le jeu étant leur activité commune principale. Ils dorment les uns contre les autres, se lèchent et s'épouillent mutuellement. De même le furet recherche spontanément le contact avec d'autres carnivores, comme les chiens ou les chats, qui peuvent être des partenaires de jeu. Les présentations doivent avoir lieu progressivement et sous surveillance. C'est souvent lui qui est en danger lors

des premiers contacts. La cohabitation avec un lapin, un rongeur ou un oiseau est difficile car l'instinct de prédation persiste.

Le furet et les enfants :

Il faut éviter la cohabitation avec de très jeunes enfants dont les gestes inadaptés peuvent exciter le furet et provoquer la morsure.

Le furet nécessite trop de soins et d'attention pour être pris en charge par un enfant de moins de 10 ans, cependant il peut devenir un excellent compagnon pour lui.



La morsure.

En tant que petit carnivore et prédateur, comme le chien et le chat, la morsure est un « mode d'expression », un moyen de défense pour le furet.


Au cours de son développement, il va apprendre à la maîtriser, la contrôler, mais elle reste un moyen de communiquer, entre congénères ou avec d'autres espèces. Ne la considérez pas comme une agression, ou considérez la comme un signe d'alerte.

Vous venez d'acquérir un fureton, que faire ?

Un jeune carnivore découvre son environnement avec sa bouche, il mordille tout jusqu'à l'âge de 6 mois environ, c'est sa manière de faire connaissance avec ce qui l'entoure. Il n'est pas « méchant » mais simplement brutal, maladroit et inexpérimenté.

Il ne faut pas confondre morsure et mordillements, ces derniers faisant partie de l'apprentissage de la communication comme nous allons le voir. Dans la portée, lorsqu'un fureton veut attirer l'attention d'un autre pour jouer, il le mord au niveau du cou puis part en courant. Les furetons entre eux jouent à la « bagarre », simulent des attaques et répètent des

séquences de prédation. Ces jeux font partie de l'apprentissage de la communication avec les autres. C'est la mère et les congénères qui vont lui apprendre à maîtriser et à contrôler sa mâchoire, on parle de l'inhibition de la morsure.



L'éducation

La capacité d'apprentissage d'un furet reste relative et il assimilera surtout ce qui l'intéresse. Il s'agit surtout d'établir une bonne relation de confiance et d'inculquer quelques règles qui permettront une cohabitation agréable. Le fureton reproduit la même séquence avec l'homme dont la peau moins épaisse que celle d'un furet est plus sensible.



Il peut également mordre plus franchement par excitation lors du jeu ou face à un geste hésitant ou de retrait. **Dans tous les cas vos gestes doivent être francs et directs, n'appréhendez pas car votre hésitation sera mal perçue et augmentera le risque de morsure.** Un intermédiaire (gants, tissus) peut être utilisé dans un premier temps pour établir le contact, mais cette solution est temporaire. **Le maître mot est la patience.** Sur-

tout n'oubliez pas qu'un fureton qui arrive chez vous se retrouve dans une situation stressante, il a tout perdu, son milieu, sa mère, sa fratrie. Laissez-lui quelques jours pour découvrir son environnement et s'adapter. Même si son attitude vous paraît enjouée, il a peur. **Ne cherchez pas le contact à tout prix et laissez le venir à vous.** N'oubliez pas non plus que le jeu est un excellent moyen d'établir une bonne relation de confiance.



Votre furet adulte mord, que faire ?

On peut distinguer plusieurs types d'agressions, classés par ordre de fréquence :

la morsure par peur:

Le furet mord souvent par peur, lorsqu'il est surpris, lorsqu'il est stressé par un environnement qu'il ne connaît pas encore (c'est sou-



vent le cas les premiers jours de son arrivée dans un nouveau foyer), lorsqu'il a été mal socialisé pendant les premières semaines de sa vie, séparé trop tôt de la mère et de sa fratrie ou laissé dans un environnement pauvre et peu stimulant (séjours trop longs en animalerie). Dans ce cas il faut songer avant tout à **le rassurer et à rétablir une relation de confiance, les manœuvres éducatives viendront plus tard.**

La morsure par irritation :

Elle est déclenchée dans certaines situations : la douleur, la frustration (un environnement inadapté: cage trop petite, enfermement trop long, solitude, manque de stimulations), la privation (de nourriture, d'exploration, de jeux), une contrainte physique (bain, coupe d'ongles, caresses prolongées). **Veillez à vérifier tous ces paramètres et les modifier si besoin.**

La morsure par attraction de certaines zones corporelles de l'homme :

Même un furet parfaitement éduqué et socialisé à l'homme continue de chercher à mordre certaines zones du corps humain, notamment les pliures des membres (poignets, bras, genoux), les pieds et les mains. Il se comporte alors comme lors d'une rencontre avec un congénère: il renifle la zone choisie, la lèche éventuellement et mord spontanément.

Il est vraisemblable que ce comportement soit motivé par la présence d'odeurs dont la composition serait proche de celles sécrétées dans la région du cou des furets mais aucune étude ne permet pour l'instant de le confirmer.

Ce comportement est difficile à corriger et il est souvent préférable d'éviter le contact avec cette zone tentatrice.



La morsure associée au comportement reproducteur :

Une femelle allaitant peut avoir un comportement de protection assez violent. **Il faut la placer dans un endroit calme et respecter sa tranquillité.**

Les mâles en rut ont parfois un comportement plus « agressif », ils se comportent en fait comme avec leurs congénères. La morsure est alors motivée par la nécessité de chasser un intrus ou « concurrent » ou par un phénomène d'excitation lorsqu'ils sont en contact avec certaines zones du corps (les poignets, les chevilles en particulier). **La castration est alors efficace pour supprimer ce type de comportement.**

La morsure « territoriale » :

Certains furets sont assez « exclusifs », ils n'acceptent dans leur territoire que leur propriétaire et se montreront assez harcelants avec un visiteur. Le furet est un animal territorial et ce comportement est difficilement contrôlable, **à vous de prévenir l'intrus et de gérer la situation.**

Contrairement au chien et au chat, on ne décrit pas chez le furet de morsures prédatrices. Cependant des attaques de furets sur des enfants en bas âges ont été rapportées aux US.

Il est déconseillé d'acquérir un furet si l'on a un enfant de moins de 3 ans. Celui-ci produit des comportements imprévisibles, des vocalises stridentes, des gestes brusques et a une façon de se mouvoir particulière qui peuvent déclencher des agressions. Comme pour tout animal, **les contacts enfants-furets doivent avoir lieu sous surveillance et contrôle d'un adulte.**

Les troubles du comportement :

Comme nous l'avons déjà évoqué un furet mal dans sa peau va exprimer son mal-être par la morsure. Les causes sont multiples et peuvent être répertoriées. Ce sont souvent de mauvaises conditions au cours des premières semaines de vie, socialisation mal effectuée ou absente, sevrage trop précoce, environnement pauvre et peu stimulant.

On obtient alors un individu craintif et qui s'adapte difficilement aux variations de son environnement. Mais même si cette phase du développement a été correctement accomplie les conditions dans lesquelles le fureton va se retrouver vont également influencer son épanouissement. Les troubles apparaîtront s'il est maintenu dans une *cage trop petite, s'il est trop enfermé et ne peut fureter et se défouler, s'il est trop souvent seul ou au contraire harcelé par un autre furet, peu stimulé ou privé de contacts (cage d'animalerie), de nourriture, de jeu.* Dans ces cas, malheureusement trop fréquents, **les tentatives d'éducatons ne seront pas bien perçues et au contraire risquent d'aggraver le malaise du furet.**

Il faut toujours éviter la brutalité qui va renforcer la nécessité de se défendre. En premier lieu **il faut améliorer les conditions de vie au maximum, lui laisser prendre ses repères et ne rien lui demander dans un premier temps, multiplier les sorties et les relations positives.**

C'est souvent par le jeu que le contact pourra être établi, il faut attendre qu'il se rassure et reprenne confiance.

Dans le cas d'un animal extrêmement peureux, le confinement sera parfois nécessaire dans un premier temps afin de le rassurer, placez le dans une cage au calme et rassuré le doucement et progressivement. Offrez-lui des moments de liberté de plus en plus long et avec de plus en plus d'espace jusqu'à qu'il maîtrise ses émotions.

Quel que soit le cas, le contact physique sera indispensable à un moment ou un autre afin que l'animal progresse, alors munissez-vous de gants ou d'un linge s'il le faut au départ mais il faut manipuler. **Le furet est un animal de contact et c'est par le contact qu'une véritable relation de confiance sera établie.** Prenez le dans vos mains et montrez lui qu'elles peuvent être agréables en le grattant doucement derrière les oreilles et en le caressant longuement.



Un furet est un furet et il faut admettre cette particularité, sinon choisissez un autre animal !!!

Attention !!! Il faut également prêter une attention particulière à un furet qui se met à mordre brutalement et contrairement à ses habitudes.

Ce furet souffre peut-être et c'est un signe d'alerte à prendre sérieusement en compte.

Quel que soit le furet, même le plus docile et coopératif, la morsure peut toujours survenir.

Certains mordent dans une situation unique et d'autres une personne en particulier et pas une autre.



RECETTE DE LA BOUILLIE DE CROQUETTES

Pour vos furets malades, convalescents, ou vieux.

Mettez des croquettes dans un bol (ici marque Totally Ferret)



Faites bouillir de l'eau (plus rapide avec une bouilloire)



Prenez un glaçon de fortol (complément alimentaire que vous trouverez chez le vétérinaire) :



Pour info, le fortol ne se conserve que 24h une fois ouvert, il est donc important d'en faire des glaçons que vous décongèlerez selon besoin. Le fortol à la base c'est une bouteille comme ceci :



Décongelez votre glaçon (pour aller plus vite vous pouvez le mettre au micro-onde quelques secondes) :



Mettre l'eau bouillante sur les croquettes, puis laissez gonfler :
Attention avec les rc kitten cela va assez vite, mais avec les totally
mieux vaut préparer la veille et laisser gonfler toute la nuit pour
qu'elles soient idéalement gonflées.



Au bout d'un quart d'heure :



Au bout d'une demi-heure :

Ecrasez vos croquettes jusqu'à obtenir une bouillie :



Continuez jusqu'à obtenir la texture souhaitée : selon le furet il faudra faire plus ou moins liquide. A tester selon leur goût, en général la texture sur la photo est appréciée par la plupart des furets. Incorporez le fortol dégelé



Mélangez encore jusqu'à la consistance voulue. Servez tiède, les furets aimeront mieux.



Attention à la conservation, vu qu'il y a du fortol dedans, évitez de leur laisser toute la journée, privilégiez plusieurs petits repas de bouillie par jour, d'une part car le furet a un transit court de 3h, d'autre part pour la conservation.

Vous pouvez préparer par avance les croquettes mouillées dans un grand bol, le filmer ou le mettre en Tupperware et le garder au frigo, afin de vous en servir à chaque bouillie, que vous tiédirez avec du fortol au micro-ondes.

A savoir que chez les furets de plus de six ans, même si aucun soucis de santé, vous pouvez les compléter par une petite bouillie journalière, ce qui leur apportera l'énergie nécessaire à leurs vieux jours.

Bon repas aux petits convalescents !!!



**CONTACT : CLUB FRANCAIS DES AMATEURS DU FURET
(CFAF)**

Adresse : 11 Rue du Golf 42390 VILLARS

Tél : 06.52.46.24.44

Mail : presidence@club-furet.org

Vous souhaitez des renseignements ou adopter un furet, contactez
le CFAF :

adoption@club-furet.org

Ne pas jeter sur la voie publique.